

Tendance d'évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines

Test de Mann-Kendall par point

(Période considérée : du 01/10/1996 au 01/10/2011)

Appartenance à un réseau de suivi DCE et tendance d'évolution

- Pas de tendance significative
- ni RCS, ni RCO
- ▼ RCO uniquement
- ▲ RCS uniquement
- RCS et RCO
- < -0.75 mg/l/an
- -0.74 à -0.50 mg/l/an
- -0.49 à -0.25 mg/l/an
- -0.24 à 0 mg/l/an
- 0.01 à 0.25 mg/l/an
- 0.26 à 0.50 mg/l/an
- 0.51 à 0.75 mg/l/an
- > 0.75 mg/l/an

★ Points ayant moins de 10 analyses des concentrations en nitrates dans la période considérée





Tableau de synthèse - Mann-Kendall

	Nombre
Points analysés dans la MESO	23
Points ayant fait l'objet d'un test Mann-Kendall	6
Tendance non significative (p-value > 0.05)	5
Tendance significative (p-value <= 0.05)	1
Tendance à la hausse (> 0 mg/l/an)	
dont > 0.25 mg/l/an	
dont > 0.5 mg/l/an	
Tendance à la baisse (< 0 mg/l/an)	
dont < -0.25 mg/l/an	
dont < -0.5 mg/l/an	

Kendall régional (nbre de points : 6)



pente : 0.15 mg/l/an

(p-value = 0.2892 : Tendance non significative au seuil de confiance 5%)

Courbe des fréquences d'apparition des pentes agrégées dans le calcul du Kendall régional

